

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалистов)

по медицинскому применению лекарственного средства

Диаротокан

экстракт жидкий для приема внутрь и местного применения

Регистрационный номер

Название лекарственного средства Диаротокан.

Международное непатентованное название Отсутствует.

Общая характеристика Прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

Состав лекарственного средства

<u>Состав</u>	<u>На 30 мл:</u>	<u>На 50 мл:</u>
Ромашки цветки	4,2 г	7 г
Ноготков цветки	2,1 г	3,5 г
Тысячелистника трава	2,1 г	3,5 г
Этиловый спирт 70 %	достаточное количество до получения 30 мл экстракта	достаточное количество до получения 50 мл экстракта

Форма выпуска Экстракт жидкий для приема внутрь и местного применения.

Код АТС A01AD.

Фармакотерапевтическая группа Прочие средства для местного применения при заболеваниях полости рта.

Фармакологические свойства

Комбинированное средство на основе компонентов растительного происхождения. Биологически активные вещества, входящие в состав экстракта, обладают местным противовоспалительным действием, ускоряют процессы регенерации тканей, проявляют спазмолитическое действие.

Показания к применению

- в стоматологии в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит);
- в гастроэнтерологии и проктологии в комплексной терапии функциональных расстройств пищеварительного тракта (диспепсия, метеоризм), хронического гастрита, хронического энтероколита, хронического колита.

Способ применения и дозировка

В стоматологии применяют местно.

Перед применением 1 чайную ложку лекарственного средства разводят в 1 стакане теплой кипяченой воды. При стоматитах и других заболеваниях слизистой оболочки полости рта назначают полоскания (1-2 мин.) или аппликации лекарственного средства (15-20 мин.) 2-3 раза в день в течение 2-5 дней. При лечении маргинального периодонта, после удаления зубного камня и кюретажа зубодесневых и костных карманов вводят в карманы тонкие турунды с раствором лекарственного средства на 20 мин. Процедуру проводят ежедневно или через день (4-6 раз).

В гастроэнтерологии лекарственное средство применяют внутрь и в виде микроклизм.

Внутрь применяют по 1/2 стакана раствора лекарственного средства из расчета 1 чайная ложка на стакан теплой кипяченой воды за 30-40 мин. до еды или через 40-60 мин. после еды 3-4 раза в день.

Для микроклизм - 1 чайную ложку лекарственного средства на 50-100 мл теплой кипяченой воды (после очистительной клизмы) 1-2 раза в сутки. Длительность курса лечения определяется врачом индивидуально, с учетом особенностей заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие

Возможны аллергические, анафилактические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как арника, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема.

- период беременности и лактации.

- детский возраст до 12 лет.

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей, окклюзия желчевыводящих путей.

- заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога (при приеме внутрь и в виде микроклизм).

Передозировка

Возможно: усиление побочных явлений.

Меры предосторожности

Содержит не менее 65 % этанола. Разовая доза лекарственного средства (1 чайная ложка) содержит не менее 3,25 % этилового спирта. Из-за содержания этилового спирта не рекомендуется принимать лекарственное средство в течение длительного времени.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Лекарственное средство не рекомендуется применять при беременности и в период лактации вследствие отсутствия адекватных данных о безопасности применения данных растительных средств и содержания алкоголя.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем:

дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризеофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарабазин.

- лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

Условия и срок хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Упаковка

Флакон 30 мл в упаковке № 1.

Флакон 50 мл в упаковке № 1.

Информация о производителе

СОАО «Ферейн»,

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52 а,

тел. +375 17 213-16-37, +375 17 213-12-58, тел./факс +375 17 222-92-18.