

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

## ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалистов)

по медицинскому применению лекарственного средства

### **Пиона уклоняющегося настойка**

**Название лекарственного средства** Пиона уклоняющегося настойка.

**МНН:** Отсутствует.

**Форма выпуска** Настойка для внутреннего применения.

#### **Общая характеристика**

Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с характерным запахом. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

#### **Состав лекарственного средства**

Спиртовое извлечение (1:10) из смеси травы и корневищ с корнями пиона уклоняющегося в равных соотношениях.

Содержит не менее 35% (об/об) спирта этилового.

**Фармакотерапевтическая группа** Прочие снотворные и седативные средства.

**Код АТХ** N05CM.

#### **Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика.* Трава и корневища пиона уклоняющегося содержат фенолы, дубильные вещества, органические кислоты. Пиона уклоняющегося настойка обладает седативным действием.

*Фармакокинетика.* Данные отсутствуют, лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества.

#### **Показания к применению**

Применяют в комплексной терапии функциональных нарушений центральной нервной системы (нарушения сна и неврастения).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

#### **Способ применения и дозировка**

Внутрь за 10-15 мин до еды, разбавив в небольшом количестве воды. Обычно назначают по 15-20 капель 2-3 раза в день. Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этилового спирта.

#### **Побочные действия**

Возможны аллергические реакции, артериальная гипотензия, сонливость, общая слабость.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, артериальная гипотензия, почечная и/или печеночная недостаточность, детский возраст до 18 лет, беременность, период кормления грудью.

В связи с содержанием этилового спирта настойка противопоказана пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога.

### **Применение при беременности и лактации**

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применение во время беременности и лактации противопоказано.

### **Применение у детей**

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применение у детей до 18 лет противопоказано.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами**

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения другой работы, которая требует повышенного внимания, быстрых психических и двигательных реакций.

### **Передозировка**

Передозировка сопровождается усилением побочных эффектов лекарственного средства (снижение артериального давления, сонливость, головокружение).

*Лечение.* В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка. Симптоматическая терапия.

### **Меры предосторожности**

Лекарственное средство содержит не менее 35% этанола, то есть 205-277 мг на разовую дозу (15-20 капель). В связи с содержанием этилового спирта настойка противопоказана пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога, беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет.

Из-за постепенного развития эффекта лекарственное средство не рекомендовано применять в случаях экстренной необходимости уменьшения симптомов психического возбуждения и нарушений сна.

Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Данные о взаимодействиях с другими лекарственными средствами ограничены.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризеофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин;
- лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия отпуска**

Отпускается без рецепта.

### **Упаковка**

По 50 мл во флаконы из стекломассы оранжевого цвета, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми, с листком-вкладышем в упаковке №1.

### **Производитель**

СООО «Ферейн»,

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52 а,

тел. + 375 17 213-16-37, +375 17 213-12-58; тел./факс + 375 17 222-92-18.