

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

## Л И С Т О К – В К Л А Д Ы Ш

по медицинскому применению лекарственного средства

### Сердечные капли

#### настойка для внутреннего применения

**Название лекарственного средства** Сердечные капли.

**Форма выпуска** Настойка для внутреннего применения.

**Общая характеристика** Прозрачная жидкость желто-коричневого цвета. При хранении допускается выпадение осадка.

**Состав лекарственного средства:**

	<u>На 25 мл</u>	<u>На 30 мл</u>	<u>На 50 мл</u>
Спиртовое извлечение валерианы корневищ с корнями (1:5)	- 8,5 мл	- 10,2 мл	- 17 мл
Спиртовое извлечение пустырника травы (1:5)	- 8,25 мл	- 9,9 мл	- 16,5 мл
Спиртовое извлечение из плодов боярышника (1:10)	- 8,25 мл	- 9,9 мл	- 16,5 мл

Содержит не менее 64 % спирта этилового.

**Фармакотерапевтическая группа** Прочие комбинации лекарственных средств для лечения заболеваний сердца. Прочие снотворные и седативные средства.

**Фармакологические свойства**

#### **Фармакодинамика**

Лекарственное средство представляет комбинацию настоек валерианы, пустырника и боярышника.

Биологически активные вещества корня валерианы обладают седативным действием, облегчают наступление сна и улучшают качество сна. Механизмы действия, которые вызывают данные клинические эффекты, были определены для различных компонентов корня валерианы (сесквитерпеноиды, лигнаны, флавоноиды) и включают в себя влияние на ГАМК-систему, A1 аденозиновые рецепторы и 5-НТ1А рецепторы. Седативный эффект при использовании валерианы проявляется медленно, но достаточно стабильно и полностью развивается только при систематическом и длительном курсовом лечении.

Биологически активные вещества, которые содержатся в плодах боярышника, способствуют увеличению коронарного кровотока, обладают кардиотоническим действием.

Биологически активные вещества, которые содержатся в траве пустырника, оказывают седативное, гипотензивное и кардиотоническое действие.

#### **Фармакокинетика**

Фармакокинетические параметры не изучены, так как лекарственные средства растительного происхождения содержат различные биологически активные вещества.

#### **Показания к применению**

В комплексной терапии функциональных нарушений центральной нервной системы (нарушения сна и неврастения).

В комплексной терапии функциональных нарушений сердечно-сосудистой деятельности.

#### **Способ применения и дозировка**

Режим дозирования индивидуальный в зависимости от состояния и возраста больного. Обычная доза по 30-40 капель, разведённые в небольшом количестве воды. Принимают внутрь за 30 мин. до еды 2-3 раза в день.

Терапевтический эффект лекарственного средства проявляется при длительном систематическом применении (2-3 недели и более). Из-за возможных нарушений функций

ЖКТ (корень валерианы) при длительном применении рекомендовано создание пауз в приеме в 2-3 недели.

Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола. Продолжительность приема у детей должна быть минимальной. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств.

#### **Побочное действие**

Возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи), головной боли, общей слабости, головокружения, снижения работоспособности, сонливости, раздражительности, тревожности, желудочно-кишечных расстройств (изжога, тошнота, отрыжка, боли в животе), артериальной гипотензии. Большие дозы могут привести к брадикардии и аритмии, а также снижению моторики кишечника (запор).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в листке-вкладыше, необходимо обратиться к врачу.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства; беременность, период лактации; детский возраст до 12 лет; артериальная гипотензия, брадикардия; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит в фазе обострения.

**С осторожностью:** заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога, детский возраст старше 12 лет.

#### **Передозировка**

**Симптомы.** Хроническая передозировка вызывает чувство угнетенности, головную боль, сонливость, дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта, тошноту, снижение работоспособности, артериальную гипотензию, нарушение сердечной деятельности (брадикардию). Острая передозировка может вызвать алкогольную интоксикацию, появление болей в животе спастического характера, чувства стеснения в груди, головокружения, тремора рук и расширения зрачков.

**Лечение.** В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. При острой передозировке необходимо провести индукцию рвоты, промывание желудка. Симптоматическая терапия.

#### **Меры предосторожности**

Лекарственное средство содержит не менее 64 % этанола, то есть 0,606-0,808 г на разовую дозу (30-40 капель).

При появлении признаков угнетения ЦНС (вялость, заторможенность) дозы уменьшают или временно (на 5-7 дней) отменяют лекарственное средство, затем дают его в меньших дозах.

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. Во время лечения необходим контроль артериального давления и ЭКГ.

Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, развиваются отеки нижних конечностей, необходимо обратиться к врачу. Необходима немедленная медицинская помощь при возникновении боли в области сердца с иррадиацией в руку, верхнюю часть живота, шею, или в случае развития дыхательной недостаточности (например, одышка).

Из-за постепенного развития эффекта лекарственное средство не рекомендовано применять в случаях экстренной необходимости уменьшения симптомов психического возбуждения и нарушений сна.

#### ***Влияние на способность к управлению автотранспортом и потенциально опасными механизмами***

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### ***Применение в период беременности и кормления грудью***

Настойка пустырника, входящая в состав лекарственного средства, способна повышать тонус матки и влиять на менструальный цикл. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта применять во время беременности и лактации противопоказано.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

*Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу!*

Не рекомендуется одновременное применение с антиаритмиками III класса, с цизапридом.

При сочетании с сердечными гликозидами (строфантин, дигоксин) происходит усиление кардиотонического действия.

Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования отрицательных комплексов.

Усиливает действие седативных, снотворных, анксиолитических, кардиотонических, спазмолитических, анальгезирующих и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему, а также аналогичный эффект гвайфенезина.

Комбинация лекарственного средства Сердечные капли с синтетическими седативными средствами требует медицинского наблюдения.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

– лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем: дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризеофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин.

– лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

### **Условия и срок хранения**

В защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта врача.

### **Упаковка**

25 мл во флаконы-капельницы из стекломассы оранжевого цвета, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми, с листком-вкладышем в упаковке №1.

30 мл во флаконы из стекломассы оранжевого цвета, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми, с листком-вкладышем в упаковке №1.

50 мл во флаконы из стекломассы оранжевого цвета, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми, с листком-вкладышем в упаковке №1.

### **Информация о производителе**

СОО «Ферейн»,

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52 а,

тел. + 375 17 213-16-37, +375 17 213-12-58; тел./факс + 375 17 222-92-18

E-mail: ferein\_by@mail.ru.